

	区分	第3類医薬品
	薬効分類	ビタミンC主薬製剤
	剤形	錠剤
	包装規格	330錠
	備考	ナトリウムフリー



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	はきけ・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続、又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

下痢

【効能効果】

- 次の諸症状の緩和
しみ、そばかす、日やけかぶれによる色素沈着
 - 次の場合の出血予防
歯ぐきからの出血、鼻出血
 - 次の場合のビタミンCの補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
- ※ただし、上記1及び2の症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【用法用量】

次の量を、食後に水またお湯でかまずに服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1～3錠	2回
11歳以上15歳未満	1～2錠	
7歳以上11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

<用法用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとで服用させること。
- 用法用量を守ること。

【成分分量】

6錠(成人の1日最大服用量)中に次の成分を含みます。

成分	含量
ビタミンCとして	2,000mg
ビタミンC(アスコルビン酸)	1,400mg
アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム塩) (ビタミンCを600mg含有)	726mg
酪酸リボフラビン(ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	6mg

添加物：ヒプロメロース、セルロース、マンニトール、ステアリン酸Mg

<成分・分量に関連する注意>

- 本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、酪酸リボフラビン(ビタミンB₂)によるもので心配ありません。
- 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがありますので、医師の治療や検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。
- 錠剤により成分のビタミンB₂(リボフラビン)による赤い斑点がみられるがありますが、効果には変わりありません。

【保管および取扱い上の注意】

- 高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管するしてください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- 錠剤に水がついたり、ボトルのフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で、薬が変質するおそれがありますので、ぬれた手で錠剤に触れないでください。また、服用のつど、フタをしっかり閉めてください。
- ボトルの中にある乾燥剤は、開封後も必ず入れたままにしておいてください。乾燥剤は、絶対にのまないでください。
- ボトルの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタを開けた後は捨ててください。
- 一度開封した後は、品質保持の点から、開封日より6ヶ月以内を目安になるべくすみやかに服用するしてください。
- 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付をご記入ください。