

	区分	第3類医薬品
	薬効分類	外用鎮痛消炎薬
	剤形	プラスター剤
	包装規格	36枚
	備考	

使用上の注意

 **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

- 次の人は使用しないこと
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能効果】

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、しもやけ、骨折痛

【用法用量】

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

<用法用量に関連する注意>

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- 本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には使用しないでください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にははがして入浴してください。また、入浴後30分経ってから使用してください。

【成分分量】

膏体100g中

サリチル酸グリコール	5.597g
ローメントール	3.148g
ノニル酸ワニルリアミド	0.021g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、赤色405号、香料を含有します。

【保管および取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 開封後は未使用分を袋に入れチャックを閉め、箱に入れて保管してください。
- 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

	区分	第3類医薬品
	薬効分類	外用鎮痛消炎薬
	剤形	外用液剤
	包装規格	50mL
	備考	発売元：株式会社グラフィコ 製造販売元：ジャパンメディック株式会社

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

- 次の部位には使用しないこと
- (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口

👤 相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能効果】

肩こり、腰痛、関節痛、筋肉疲労、筋肉痛、打撲、ねんざ、骨折痛、しもやけ

【用法用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診察を受けてください。
- (4) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 入浴前後の使用はさけてください。
- (7) 入浴時や発汗時に、本剤による刺激感や痛み、熱感を感じる場合があります。これらの症状を強く感じる場合は使用を中止し、患部をよく泡立てた石けんでやさしくなでるように洗い、水で流した後、冷水や軽くしぼったぬれタオル等で十分に冷やしてください。症状の改善がみられない場合は、この箱を持って医師に相談してください。
- (8) 塗布した患部をコタツや電気毛布で温めないでください。
- (9) 皮膚の弱い人は、同じところに続けて塗布しないでください。
- (10) 本剤を塗った後の患部を通気性の悪いものでおおわないでください。
- (11) スポンジ面をゆっくり患部に押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから患部に塗布してください。薬液をスポンジ面にしみ込ませないで使用すると、スポンジが破損する場合があります。また、スポンジ面に、薬液をしみ込ませても、強く押し当てたまま塗布しますと、スポンジが破損する原因になりますのでご注意ください。

【成分分量】

膏体100g中

サリチル酸グリコール	3.0 g
l-メントール	6.0 g
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.1 g
ニコチン酸ベンジルエステル	0.02 g
ノナン酸パニリルアミド	0.012 g

添加物として、プロピレングリコール、エタノール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、香料

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 使用後は、必ずキャップを十分に締めて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。横に倒して保管したり、キャップがしっかりしまっていないと、まれに薬液がもれ出す場合がありますのでご注意ください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わってしまうことがあります。）
- (4) 時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしたある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (5) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。